

LE BISON

Le bison possède un manteau d'hiver aux longs poils brun foncé et un pelage d'été plus léger, d'un brun plus clair. La taille du bison peut atteindre 2 mètres de hauteur au garrot.

Il pèse en moyenne entre 450 kg et 900 kg.

Le bison est un herbivore qui se nourrit des herbes trouvées dans les prairies.

Les femelles sont vivipares, comme tous les mammifères. À l'accouplement, la femelle portera seulement un petit. Les bébés bisons sont rouges, et deviennent complètement bruns en 4 mois. Les parents prennent soin de leurs bébés pendant 7-8 mois et deviennent solitaires à la fin de la première année.



Le bison d'Amérique du Nord est l'une des deux espèces de bison encore vivantes, l'autre étant le bison d'Europe.

Le Bison d'Amérique vit seulement dans les parcs nationaux du Canada. Vu que l'espèce est en voie d'extinction, elle est protégée.

L'OURS POLAIRE

Les ours polaires ont une longévité de 15 à plus de 30 ans dans la nature. Ils bénéficient d'un odorat développé. Leur vue et leur ouïe est comparable à celle des chiens. À l'approche de l'hiver, les ours blancs hibernent pendant près de 6 mois.



L'ours polaire est omnivore mais principalement carnivore. Il se nourrit de phoques, de poissons, d'oiseaux de mer et de rennes. L'été, il peut se nourrir de baies et de végétations diverses.

Les ours blancs vivent dans toutes les zones autour du Pôle Nord. De façon générale, on le retrouve au Groenland et dans les régions les plus au nord de l'Amérique du Nord et de l'Asie.

Après une gestation de 9 mois, l'ourse accouche de un à quatre oursons; elle est donc vivipare. Les oursons sont très petits et requièrent des soins maternels pendant deux à trois ans. Les oursons doivent être protégés des mâles âgés, qui sont parfois capables de les tuer et de les manger.

L'ÉLAN

L'élan est aussi appelé orignal.

L'élan est un animal indépendant et solitaire en été, qui ne vit en couple qu'au moment du rut.



Les élans se reproduisent de septembre à fin octobre.

La période de gestation dure environ 8 mois.

La femelle met au monde un seul petit et rarement des jumeaux.

Le petit naît sans défense. Sa mère le cache de ses nombreux ennemis dans un fourré ou sur une île pendant quelques jours.

Il se nourrit essentiellement d'herbe, de plantes aquatiques qu'il peut brouter la tête entièrement immergée sous l'eau (il reste parfois une minute en plongée), de feuillage, de branches et d'écorce et d'autres végétaux.

Les élans ou orignaux vivent dans les forêts boréales et les forêts mixtes de feuillus de l'hémisphère nord. On trouve l'élan en Alaska, au Canada, en Scandinavie, en Pologne et en Sibérie.

LA MOUFETTE

La moufette habite dans un terrier qui possède cinq sorties pour brouiller ses pistes. Parfois cet animal utilise des vieux terriers qu'elle partage pacifiquement avec des marmottes.



La moufette est connue pour sa senteur affreuse. Lorsqu'elle se sent menacée : elle lève sa queue, tourne son dos à l'adversaire et elle projette un double jet de liquide puant.

Elles donnent naissance à une portée pouvant de 5 ou 6 petits. Les nouveau-nés sont sourds et aveugles. Vers 3 semaines, leur fourrure est épaisse et leurs yeux s'ouvrent.

Ils suivent leur maman partout : dans ses excursions, la nuit...

La moufette est omnivore. Elle se nourrit d'insectes et de petits mammifères tels le campagnol, la souris et la taupe. Elle mange aussi des petits fruits, des graines, des noix et des feuilles.

LE COYOTE

Cet animal est très rapide. Il peut atteindre 65 km/h. Il est aussi doté d'un odorat et d'une ouïe extrêmement développés. Malheureusement, il a une très mauvaise vue. Il doit donc chasser de nuit pour ne pas être aveuglé par le soleil.



Il y a environ quatre à dix petits par portée.

Le jeune atteint sa maturité sexuelle à l'âge d'un an.

Ce mammifère se nourrit habituellement de souris des champs, de lièvres, de petites marmottes, d'écureuils et quelques fois de charogne laissée par d'autres prédateurs. Il peut aussi manger de l'herbe mais seulement quand il n'a rien trouvé de mieux.

Ce mystérieux animal vit dans les plaines, les petits boisés et les champs. Il se creuse un petit terrier. Nous retrouvons surtout cet animal au Québec et aux États-Unis. Le coyote délimite son territoire en urinant sur les arbres ou en laissant ses excréments ici et là.

LE CASTOR


Le Castor du Canada peut vivre jusqu'à 20 ans. Les prédateurs du castor sont l'ours, le loup, le Coyote, la loutre et le lynx. L'homme est aussi son principal prédateur pour sa fourrure.

Le castor est connu pour construire des barrages naturels sur les cours d'eau au moyen de branches et de troncs.

Le castor est répandu partout au Canada. Il vit le long des cours d'eau.

La famille castor vit dans la même hutte pendant l'hiver et occupent toute l'année le même territoire.

Le castor reste fidèle à sa partenaire tout au long de sa vie. Une portée comporte généralement entre deux et quatre petits qui naissent avec une fourrure complète et les yeux ouverts, à l'intérieur de la hutte.



Le castor est exclusivement herbivore. Selon les saisons, il se nourrit d'écorces tendres, de pousses, de fruits, d'herbe, de feuilles... Il est caecotrophe (comme la marmotte), c'est-à-dire qu'il digère deux fois ses aliments en ravalant ses crottes molles.

LE CARIBOU

Le caribou est sociable. Il se tient en grand groupe. Ses ennemis sont le loup, le lynx, le grizzli et l'humain.

Le point le plus marquant est que les femelles portent des bois.

Les caribous font 1 petit comme nous. Leurs gestation est de 7,5 à 8 mois. Ils sont vivipares.

Les caribous sont herbivores. Ils broutent des feuilles de saules, des bourgeons d'arbuste et de l'herbe. Ils se nourrissent aussi de lichens et de plantes basses. Les caribous aiment beaucoup les champignons on dit que c'est leur gâterie. L'hiver, ils mangent des rameaux de saules et de bouleaux.



Le caribou habite dans l'Amérique du Nord. Il habite au Canada, Groenland, Alaska et aux États-Unis.

L'ÉCUREUIL ROUX

L'écureuil est connu pour sa longue queue « en panache » lui sert de balancier et de gouvernail lorsqu'il grimpe ou bondit.



Il consomme de nombreux champignons mais aussi des pignons, des glands, des châtaignes, des noix, des noisettes, des écorces, des bourgeons.

On retrouve l'écureuil roux au Canada et aux États-Unis. L'écureuil habite les bois et les forêts de feuillus ou de résineux, les parcs et les grands jardins boisés.

Le plus souvent, l'écureuil n'a qu'une seule portée par an de 3-4 petits.

Les petits naissent dans le nid, aveugles et dépourvus de poils qui apparaissent au bout de deux semaines. Vers 9 semaines, leurs yeux s'ouvrent et les incisives sortent. C'est l'âge auquel ils commencent à quitter le nid, mais la mère reste vigilante et les prend dans sa gueule pour les mettre en sécurité au premier danger.

LA BALEINE A BOSSE

Les baleines vivent en groupe dans les fonds marins.
En été, elles vivent au large du Canada et l'hiver dans le sud.
Elles aiment beaucoup voyager.



Elles peuvent avoir qu'un petit par portée. La gestation de la baleine à bosse est de 11 à 12 mois.

Les adultes atteignent habituellement 14 mètres de long et pèsent en moyenne 25 tonnes.

Elles aiment chanter et vivent en groupe.

Elle se nourrit exclusivement pendant l'été et vit sur ses réserves de graisse pendant l'hiver. C'est un prédateur actif qui chasse le krill et les bancs de petits poissons tels les harengs, usant de l'attaque directe ou étourdissant ses proies en frappant l'eau avec ses nageoires.

LA LOUTRE

La loutre est une excellente nageuse qui possède l'aptitude de fermer ses oreilles et ses narines lorsqu'elle plonge dans l'eau et peut demeurer sous l'eau pendant 2 minutes. A terre, elle se déplace en trottant ou en galopant. La plupart des espèces ne vivent qu'en eau douce, cependant la loutre de mer, comme son nom l'indique vit dans l'eau salée mais elle a besoin d'eau douce pour le toilettage et l'entretien de sa fourrure.

La loutre est carnivore et se nourrit de poissons, de crustacés et de mollusques.

La loutre a une portée annuelle. Après 2 mois de gestation, la femelle met au monde dans le terrier 2 à 3 loutrons, aveugles à la naissance.



La loutre habite tous les milieux aquatiques pourvu qu'elle y trouve de la nourriture et des abris en suffisance. Ses principaux refuges sont des abris sous roche, des massifs de broussailles sur les berges ou des terriers. On la retrouve en Amérique et en Europe.

LE LYNX

Le Lynx est reconnaissable grâce à ses larges pattes et à ses oreilles triangulaires longues et ornées d'une touffe de poils noirs appelée « pinceau ».



Il vit souvent dans une grotte, un terrier de blaireau, des broussailles, sous un rocher en surplomb ou sous un arbre renversé.

Le lynx roux et le lynx du Canada vivent essentiellement au Canada et aux Etats-Unis.

Le Lynx est un animal exclusivement carnivore. Il mange surtout des lièvres, des rongeurs, des chevreuils (surtout les jeunes), mais aussi de jeunes rennes et chamois ou des oiseaux.

La femelle donne naissance en mai-juin à 2 ou 3 petits. Les jeunes ouvrent les yeux vers 16-17 jours et sortent du gîte à environ 4 mois. Le mâle n'est pas admis dans le gîte quand les jeunes naissent, mais il apporte de la nourriture à la femelle pendant 2 mois. Les jeunes restent avec leur mère environ un an.

LE RATON LAVEUR

Le Raton laveur se reconnaît facilement à sa queue cerclée de noir et de blanc, et son visage au masque noir. Il a des petites mains très habiles à manipuler de petits objets.



On le retrouve en bordure des forêts, le long des cours d'eau et dans les marécages d'Amérique du Nord. Il peut aussi vivre dans les parcs urbains.

Le raton laveur s'abrite dans les arbres creux, les souches, les terriers de marmottes abandonnés ou les hangars.

Il change souvent d'abri.

Il mange de petits animaux aquatiques : moules, écrevisses, poissons, grenouilles, tortues, ... Il s'alimente aussi de petits mammifères (rats musqués, mulots). Il peut aussi s'attaquer aux poules.

En été et en automne, il privilégie le maïs, les fruits, les baies, les glands et les noix. Dans les villes, il fouille dans les poubelles qu'il ouvre aisément avec ses doigts agiles.

Une portée comprend entre un et trois ratonneaux. Ils se nourrissent du lait maternel et ne quittent leur mère que vers 1 an.

LE PORC EPIC D'AMERIQUE

Il habite toute l'Amérique du Nord : essentiellement en forêts, mais aussi dans les déserts et la toundra.

Parfois il pénètre les zones habitées.



Un seul petit vient au monde après 7 mois de gestation; ses piquants sont courts et mous. Sa durée de vie peut atteindre 18 ans.

S'il se sent en danger, le porc-épic tentera tout d'abord de gagner l'abri le plus proche. Mais si la retraite est impossible, il chargera en reculant, et menacera l'intrus en détachant alors les plus fragiles de ses 30 000 qui fendront l'air comme s'ils avaient été projetés.

Cet animal se nourrit d'écorce, de feuilles, d'aiguilles de pins, et parfois de graines et de fruits. Il a une très mauvaise vue c'est donc son odorat qui lui permet de trouver sa nourriture.

LE PHOQUE

Lorsqu'il en chasse, le phoque gris ne s'aperçoit que de temps à autres, lorsqu'il sort sa tête de l'eau pour prendre une bruyante respiration en surface. Il retourne alors à l'exploration de ses rochers.

En mer, le phoque est un bon nageur, il se déplace en godillant



Les phoques sont carnivores et leur alimentation se compose essentiellement de poissons côtiers.

Les femelles mettent bas après 11 mois de gestation, dans le calme d'îlots rocheux les plus isolés possible.

Les trois premières semaines de leur vie, les petits sont allaités ; ils sont recouverts d'une fourrure blanche, très jolie (et très convoitée) mais perméable.

En hiver, il vit principalement sur la banquise. On les aperçoit au large du Canada et de l'Alaska.

LE PINGOUIN TORDA

Ces oiseaux, qui passent la majorité de l'année dans l'océan Atlantique, nichent sur des falaises ou des côtes rocheuses de l'Atlantique nord. On les trouve le long des côtes de l'Amérique du Nord, en Islande et en Europe (en France), ou encore en Russie.



Ils pêchent sous l'eau du poisson, comme le lançon, le hareng et le capelan, quelques crustacés et parfois des vers marins.

Les petits pingouins ne peuvent guère marcher sur leurs pattes. Les adultes restent plus souvent tout au bord de leurs plongeoirs surplombant la mer, d'où ils se laissent tomber en voletant pour aller pêcher sous l'eau.

Le nid est un trou creusé par le père sous un arbuste ou un rocher, au bord d'une falaise ou équivalent, permettant ainsi aux parents un décollage plus aisé. Les parents couvent à tour de rôle pendant 26 à 32 jours. Après l'éclosion, le petit est nourri par ses parents de poissons, mollusques et crustacés. L'oisillon gagne la mer vers l'âge de 8 semaines.

LE GRIZZLI

Le grizzli est un ours brun vivant au Nord des États-Unis et au Canada. Il se choisit une tanière protégée, une grotte, une crevasse ou un tronc creux pour passer les mois d'hiver à dormir.



Le grizzli accumule 200 kg de graisse afin de traverser l'hiver dans un état de léthargie qui n'est toutefois pas une réelle hibernation. Le grizzli est omnivore, il se nourrit de plantes et de baies, de racines, de pousses et de fougères mais aussi de poissons, des palourdes, des insectes et de petits mammifères. Au total, 90 % de son régime alimentaire est végétal.

Chaque année, la femelle donne naissance de un à quatre petits d'un kilo environ. Les oursons naissent hiver dans l'obscurité de la tanière maternelle, ils sont allaités par leur mère jusqu'à 18 mois.

Les Amérindiens l'appellent aussi « frère des hommes » car lorsqu'il se lève sur ses deux pattes on dirait une espèce d'homme.

L'AIGLE A TETE BLANCHE

Cet aigle vit près des lacs, des rivières et des zones côtières, où il peut trouver sa nourriture.



Il mange principalement du poisson. Mais il est opportuniste et peut se nourrir de bien d'autres animaux comme les pingouins, les mouettes, les canards, les oies, les lapins, les renards, les rats laveurs, les loutres de mer et les faons.

Mâle et femelle construisent ensemble le nid. La femelle pond généralement deux œufs par an. Les parents couvent à tour de rôle puis demeurent avec les oisillons. Le mâle et la femelle se relaient pour s'occuper de leur progéniture, améliorer le nid et chercher de la nourriture.

Le pygargue à tête blanche est l'oiseau national des États-Unis. Il est l'un des symboles les plus connus du pays et apparaît sur la plupart des sceaux officiels, y compris sur celui du Président américain.

LE VISON

À l'état sauvage, on le trouve à l'origine en Amérique du nord. Il dort caché dans les hautes herbes. Il habite parfois les troncs creux, les ronciers, les tas de bois, ou utilise le terrier de ses proies....



Selon son habitat, le vison consomme plus ou moins de poissons, de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de crustacés ou d'insectes de façon variée...

Il n'y a qu'une portée par an de 5 visonneaux. Les petits naissent aveugles et sourds. Vers l'âge de 3 semaines, leurs yeux s'ouvrent, ils commencent à marcher dans le nid. Lorsqu'ils appellent leur mère, leur cri ressemble au jappement d'un petit chien.

Le vison d'Amérique est un animal semi-aquatique, essentiellement crépusculaire et nocturne. Une grande partie de la journée est consacrée à la toilette et au sommeil, la nuit correspond davantage à la période de chasse.

LE PUMA

Il est également connu dans certaines régions sous le nom de couguar, cougar, lion des montagnes.

Le puma est un animal difficile à observer et solitaire.



Il ressemble à une panthère et se rencontre en Amérique du Nord et du Sud.

Le puma peut occuper une grande variété d'habitats mais l'extension humaine les a repoussés en montagne.

À la naissance, les jeunes sont aveugles et ne mesurent que 30 cm. Une portée, qui peut aller jusqu'à six petits. La femelle met bas dans une tanière (fourré, caverne, cavité, etc.) tous les deux ans en moyenne.

Ils attaquent en général les grands mammifères comme les cerfs ou les élans mais aussi des animaux plus petits si nécessaire, jusqu'à pêcher ou de se nourrir d'insectes¹² ou de lézards⁶. En moyenne, un puma d'Amérique du Nord consomme un cerf tous les sept à dix jours,

LE MOUFLON CANADIEN

Le mouflon est un ruminant dont le mâle porte de lourdes cornes recourbées en volutes.

Ils sont bien adaptés à grimper en terrain pentu où ils cherchent à se protéger des prédateurs tels que coyotes, aigles et pumas.

Ils vivent en grands troupeaux au Canada. Ils ne peuvent être domestiqués.

La brebis donne naissance à un, ou rarement deux, agneaux. Les agneaux cessent de téter le lait quand ils atteignent 4 à 6 mois.



Les mouflons canadiens mangent des herbes et des plantes arbustives, en particulier en automne et en hiver, et ils recherchent les gisements naturels de sel.